



COSMO BIO CO., LTD.

Inspiration for Life Science

Monoclonal Antibody to Multiubiquitin Chains (FK1)

CATALOG NUMBER:	NBT-MFK001
QUANTITY:	0.5mg
CLONE:	FK1
SOURCE OF ANTIGEN:	crude preparation of polyubiquitylated-lysozyme
SOURCE:	BALB/C Mouse implantation ascites
SPECIFICITY:	Does not react with methyl ubiquitinated protein and free-ubiquitin
FORMAT:	Purified Protein
CONCENTRATION:	10mg/ml
ISOTYPE:	IgM
PURIFY:	Gel filtration
PURITY:	1 band (IgM) Cellulose acetate Electrophoresis
PRESENTATION:	Liquid in 10mM phosphate buffer with 0.15M NaCl , pH7.4, 0.1% Sodium Azide
STORAGE/HANDLING:	Maintain at 4 °C-8 °C (-20 °C for long term storage) in undiluted aliquots. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
REFERENCE:	(1)M.Fujimoto, H.Sawada, and H. Yokosawa, FEBS Lett.349,173-180(1994) (2)K. Takada, H.Nasu, H.Hibi, Y. Tsukada, K. Ohkawa, M.Fujimuro, H. Sawada, and H. Yokosawa, Eur. J. Biochem. 223, 42-47(1995)

For research use only; not for use as a diagnostic.




COSMO BIO CO., LTD.

Inspiration for Life Science

TOYO EKIMAE BLDG, 2-20, TOYO 2CHOME, KOTO-KU, TOKYO 135-0016, JAPAN

TEL: +81-3-5632-9617 FAX: +81-3-5632-9618 e-mail: export@cosmobio.co.jp

www.cosmobio.co.jp



抗ポリユビキチンタンパク質 モノクローナル抗体

タンパク質分解のシグナルとして働くポリユビキチンタンパク質を認識するモノクローナ抗体。FK 1 抗体 (IgM) は、Western Blot 解析で、遊離のユビキチンおよびポリユビキチンタンパクを形成できないメチルユビキチン化タンパク質と交差反応しない。FK 2 抗体 (IgG1) は、Western Blot 解析で、遊離のユビキチンとは交差反応しないが、メチルユビキチン化タンパク質と交差反応する(1)。なお、FK2 抗体を用いたサンドイッチ ELISA でポリユビキチンタンパク質を定量できる(2)。

品番	品名	クロ-ン	サブクラス	包装	価格
MFK-001	抗マルチユビキチン鎖	FK1	IgM	0.5mg	20,000
MFK-002	抗マルチユビキチン鎖	FK1	IgM	1.0mg	35,000
MFK-003	抗マルチユビキチン鎖	FK2	IgG1	0.5mg	20,000
MFK-004	抗マルチユビキチン鎖	FK2	IgG1	1.0mg	35,000


本品は、ポリユビキチン化リゾチームで免疫したBalb/cマウスの脾細胞と、マウスミエローマ細胞(P3/x63-Ag8, 653)との細胞融合により得られたハイブリドーマの產生するモノクローナル抗体であり、移植マウス腹水よりイオン交換樹脂、ゲル濾過等により精製したものです。

(1) M. Fujimuro, H. Sawada, and H. Yokosawa, FEBS Lett. 349, 173-180 (1994)

(2) K. Takada, H. Nasu, N. Hibi, Y. Tsukada, K. Ohkawa, M. Fujimuro, H. Sawada, and H. Yokosawa,

Eur. J. Biochem. 233, 42-47 (1995)

株式会社日本バイオテスト研究所
東京都国分寺市東戸倉1丁目15-3
TEL 042-321-0921
FAX 042-323-7025
e-mail: jutaku@nbiotest.co.jp
www.nbiotest.co.jp



N B T

抗ポリュビキチンタンパク質モノクローナル抗体

カタログ No. M F K - 0 0 1

クローン F K 1

クラス・サブ・クラス I g M

L o t

抗 体 量 0. 5 m g

蛋白濃度 1 m g / m l (Bradford 法)

由 来 B A L B / C マウス移植腹水

精 製 法 硫安塩析、ゲルfiltration

溶 液 0. 15 M NaCl、0. 09% アジ化ナトリウムを含む
10 mM P B. pH 7. 2

精製純度 S D S - P A G E (6%、非還元、C B B 染色)

保 存 法 4 ~ 8 °C
長期保存の場合は -20 °C 以下にて凍結保存して下さい。
凍結融解はできるだけ避けて下さい。

備 考 白濁していて従来の吸光度法では蛋白定量ができない為、
蛋白定量法を Bradford 法に採用した。

株式会社日本バイオテスト研究所
東京都国分寺市東戸倉 1丁目15-3
TEL 042-321-0921
FAX 042-323-7025
e-mail: jutaku@nbiotest.co.jp

www.nbiotest.co.jp