

説明書

1. 製品情報

品番	J202
品名	ABA-Biotin
	マッシュルームレクチン-ビオチン標識
製品形状	凍結乾燥粉末（塩フリー）

保存 Store at 2-8°C

2. 規格

凝集活性	< 20 μg protein/mL (ウサギ赤血球(2%v/v))
ビオチニル化量	> 2.0 mol/mol Lectin

3. 使用上の注意

レクチンに緩衝液を加え、濃度 1 - 2 mg/mLに調整します。用いる緩衝液は下記をご参考ください。

LECTIN&GLYCOANALYSIS NEWS-レクチンの溶解性

強く攪拌すると沈殿が生じますので自然溶解させます。

使用直前に緩衝液で適当な濃度に希釈してご使用ください。

溶解後は小分けして -20°Cで凍結保存してください。

凍結融解を繰り返さないでください。

注意

- ラベル表示の記載事項を必ずご確認下さい。
- 転倒・落下防止策をとったうえで管理して下さい。
- 開封の際は、怪我などにご注意下さい。
- ご使用の際は、試薬に触れることがないようにし、眼鏡・手袋・マスク等を着用下さい。なお、試薬が目や口に入ったり皮膚に付着した場合は、直ちに大量の水で洗い流し、必要があれば医師の診断等を受診して下さい。
- ご使用後の廃棄物に関しては、関連法規等を遵守し、適切に処理して下さい。
- 当社より提供する試薬は研究用ですので、医薬品としてのご使用等その他の目的でのご使用は行わないで下さい。

データシート

ABA マッシュルームレクチン	
ABA - Biotin	品番 : J202 包装 : 1mg ・ 製品形状 凍結乾燥品（塩フリー） ・ 保存 4°Cで 1 年間安定 ・ 用途 糖タンパク質糖鎖の染色、検出
●起源	マッシュルーム (<i>Agaricus bisporus</i>)
●糖特異性	β -D-Gal および D-GalNAc ¹⁾ 特に Gal β 1-3GalNAc α 1-Ser/Thr (T 抗原) に強く結合 ²⁾
●マイトージェン活性	なし
●血液型特異性	非特異
●構造	分子量 16,000 の糖タンパク質で、サブユニット 4 個からなる ³⁾ 。 4 種のアミノ酸組成および等電点の異なるイソレクチンが存在する。
●特徴	Gal β 1-3GalNAc 構造を有するムチン型糖鎖に結合し、アスパラギン型糖鎖には結合しない。 Sia α 2-3(6)Gal β 1-3GalNAc α 1-Ser/Thr のような α 2-3 または 2-6 結合のシアル酸をもつ糖鎖にも結合する点がピーナッツレクチン (PNA) と大きく異なる。

文献

- 1) Nakamura-Tsuruta, S., Hirabayashi, J., et al., *Biochem Biophys Res Commun.*, **347**, 215 (2006)
- 2) Kaifu, R., Osawa, T., *Carbohydr. Res.*, **69**, 79 (1979)
- 3) Sueyoshi, S., Tsuji, T., *Biol. Chem. Hoppe-Seyler*, **366**, 213 (1985)